




RECOMMANDATIONS

MPOX





SYMPTÔMES

PHASE 1


- Fièvre
- Fatigue
- Toux
- Maux de tête
- Gonflement des ganglions & des amygdales
- Douleurs articulaires musculaires & dorsales

PHASE 2

- Apparition de boutons douloureux & démangeaisons



TRANSMISSION



De humain à humain

- Par contact direct avec les lésions cutanées, liquides biologiques (sang, salive)
- Par voie sexuelle
- Par gouttelettes salivaires (toux, éternuements, parole),
- De la femme enceinte au fœtus
- Par contact indirect : objets contaminés (literies, serviettes, lingerie, ustensiles)



RECOMMANDATIONS SI SUSPICION

→ Respecter la distance

→ Porter un masque et des gants

→ Éviter les contacts directs

→ Respecter les mesures d'hygiène
[se laver fréquemment les mains avec de l'eau et du savon,
éternuer dans son coude,...]

→ Bien nettoyer son environnement

→ Isoler les cas suspects



4 COMPLICATIONS POSSIBLES

Chez les **personnes fragiles**:

- Infection pulmonaire, des yeux et du cerveau
- Difficultés à respirer
- Déshydratation (par vomissement et diarrhées)
- Surinfection cutanée





Un cas suspect ? Pas de panique

**Contactez Cover pour un
accompagnement aux
urgences.**

✉ equipe-cover@projetlama.be

☎ +32 473 88 32 20 ou +32 484 12 90 88



Plus d'info?

Rendez-vous sur :

WWW.COVER.BRUSSELS

